



答え

- 1 心筋梗塞（MI）とはどのような状態か？
 - a) 心室が収縮できなくなる病気
 - b) 心臓の冠動脈が一部狭くなった状態
 - c) 冠動脈が閉塞して心筋が壊死した状態
 - d) 洞結節の自動能が異常に上昇した状態
- 2 冠性T波に関する正しい記述はどれか？
 - a) 幅広い陽性T波
 - b) 深く左右対称な陰性T波
 - c) 振幅の大きいP波
 - d) PR間隔の延長
- 3 「レシプロカルチェンジ」とはどのような変化か？
 - a) QT延長と一致して起きるT波の変化
 - b) 梗塞部と同じ誘導での同方向ST変化
 - c) 梗塞部と対側の誘導での反対方向ST変化
 - d) 心房と心室の同時興奮による波形重複
- 4 左前下行枝（LAD）の異常を最も反映しやすい誘導は？
 - a) II、III、aVF
 - b) I、aVL、V5～V6
 - c) V1～V4
 - d) aVR
- 5 下壁梗塞の対応血管は？
 - a) LAD
 - b) LCx
 - c) RCA
 - d) LMCA
- 6 冠性T波が出る時期は？
 - a) 超急性期
 - b) 急性期直後（数時間）
 - c) 亜急性期（数日～数週）
 - d) 陳旧期（数か月）
- 7 異常Q波が示唆する心筋状態
 - a) 心室の過興奮
 - b) 一時的な虚血
 - c) 完全な壊死
 - d) 収縮低下
- 8 陳旧性心筋梗塞の所見として正しいのは？
 - a) ST上昇が持続
 - b) 深く左右対称な陰性T波が持続
 - c) 異常Q波のみが残存
 - d) 高いR波が出現
- 9 前壁・中隔・側壁にすべて異常が出ると考えられるのは？
 - a) 単純な前壁梗塞
 - b) LCxの閉塞
 - c) 広範囲前壁梗塞
 - d) RCAの完全閉塞
- 10 側壁梗塞で最も変化が出やすい誘導は？
 - a) V1、V2
 - b) I、aVL、V5、V6
 - c) II、III、aVF
 - d) aVR、aVL、aVF