



問題

- 1 ST低下が最も病的であるとされる波形はどれか？
 - a) 上昇型ST低下
 - b) 水平型ST低下
 - c) 下行型ST低下
 - d) 早期再分極型
- 2 ST低下が非特異的変化として扱われるのはどれか？
 - a) 水平型
 - b) 下行型
 - c) 上昇型
 - d) 盆状型
- 3 ST低下の中で虚血が強く疑われるパターンは？
 - a) 盆状型
 - b) 上昇型
 - c) 水平型
 - d) 早期再分極型
- 4 ジギタリス中毒で起こりうる危険な不整脈は？
 - a) 洞性頻脈
 - b) 心室頻拍
 - c) 洞徐脈
 - d) 上室性頻拍
- 5 後壁梗塞の存在をより確実に確認するために行う追加誘導は？
 - a) aVR, V1
 - b) V7～V9
 - c) V3R～V4R
 - d) II, III, aVF
- 6 以下のうち、安静時でも症状が出る狭心症タイプはどれか？
 - a) 労作性狭心症
 - b) 不安定狭心症
 - c) 冠攣縮性狭心症
 - d) BとC両方
- 7 肥大型心筋症を示唆するST-T変化として最も典型的なのは？
 - a) 非対称性陰性T波 + ST低下
 - b) 左軸偏位 + 陽性T波
 - c) J波 + ST上昇
 - d) QT短縮とST上昇
- 8 ジギタリス効果と中毒の違いとして正しいものは？
 - a) 効果では洞停止を起こす
 - b) 効果では盆状ST低下、中毒では致死性不整脈
 - c) 中毒では陰性T波が起こる
 - d) 効果ではQT延長が目立つ
- 9 運動負荷試験でST低下が出現した場合、最も示唆される病態は？
 - a) 高血圧性心肥大
 - b) 心筋虚血
 - c) 徐脈
 - d) ジギタリス効果
- 10 肥大型心筋症のST変化で誤っているものはどれか？
 - a) 再分極異常によるST低下が見られる
 - b) 特にV5・V6でT波の陰性化が目立つ
 - c) IST上昇が多くみられる
 - d) 胸部誘導で異常Q波がみられることがある