



答え

1 ST低下が最も病的であるとされる波形はどれか？

- a) 上昇型ST低下
- b) 水平型ST低下
- c) 下行型ST低下
- d) 早期再分極型

2 ST低下が非特異的変化として扱われるのはどれか？

- a) 水平型
- b) 下行型
- c) 上昇型
- d) 盆状型

3 ST低下の中で虚血が強く疑われるパターンは？

- a) 盆状型
- b) 上昇型
- c) 水平型
- d) 早期再分極型

4 ジギタリス中毒で起こりうる危険な不整脈は？

- a) 洞性頻脈
- b) 心室頻拍
- c) 洞徐脈
- d) 上室性頻拍

5 後壁梗塞の存在をより確実に確認するために行う追加誘導は？

- a) aVR, V1
- b) V7～V9
- c) V3R～V4R
- d) II, III, aVF

6 以下のうち、安静時でも症状が出る狭心症タイプはどれか？

- a) 労作性狭心症
- b) 不安定狭心症
- c) 冠攣縮性狭心症
- d) BとC両方

7 肥大型心筋症を示唆するST-T変化として最も典型的なのは？

- a) 非対称性陰性T波 + ST低下
- b) 左軸偏位 + 陽性T波
- c) J波 + ST上昇
- d) QT短縮とST上昇

8 ジギタリス効果と中毒の違いとして正しいものは？

- a) 効果では洞停止を起こす
- b) 効果では盆状ST低下、中毒では致死性不整脈
- c) 中毒では陰性T波が起こる
- d) 効果ではQT延長が目立つ

9 運動負荷試験でST低下が出現した場合、最も示唆される病態は？

- a) 高血圧性心肥大
- b) 心筋虚血
- c) 徐脈
- d) ジギタリス効果

10 肥大型心筋症のST変化で誤っているものはどれか？

- a) 再分極異常によるST低下が見られる
- b) 特にV5・V6でT波の陰性化が目立つ
- c) ST上昇が多くみられる
- d) 胸部誘導で異常Q波がみられることがある